

AGITA[®] 10 WG

Postřiková nástraha ve formě vodorozpustného granulátu k hubení mouchy domácí, které se aplikuje nátěrem nebo postřikem.

Používá se ve všech objektech, kde se moucha domácí vyskytuje, objektech živočišné výroby i za přítomnosti zvířat.

Účinná látka: 10 % thiamethoxam, 0,05 % Z-9-Tricosen

**POZOR ! MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI !
POZOR ! PRO VČELY JEDOVATÝ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ ! NESMÍ BÝT POUŽITO
JINAK, NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ !**

AGITA 10[®] WG je insekticidní přípravek s účinnou látkou nové chemické skupiny. Nástraha se aplikuje pouze na místa, která jsou mouchami vyhledávána jako sedací plochy, jako jsou okna a dveře a jejich okolí, zdroje tepla, části stěn, konstrukcí, technologie apod.. Používá se i za přítomnosti zvířat. Aplikuje se formou vodní suspenze postřikem ručními nebo motorovými postřikovači. Rovněž je možná aplikace natíráním štětcem.

Návod k použití:

Aplikace nátěrem

Důkladně promíchejte 100 g přípravku AGITA 10[®] WG a 80 ml vlažné vody tak, aby vznikla stejnorodá řídká pasta. Vodu je třeba přidávat po částech podle konzistence pasty. Toto množství postačuje k ošetření budovy s podlahovou plochou 25 m² nebo odpovídající ploše stěn/stropu 50 m². Natřete minimálně 8 plošek cca 10 x 30 cm tam, kde mouchy nejčastěji usedají (např. slunné stěny, rámy oken, dojíací potrubí atd.). Takto je třeba ošetřit cca 2,5 % celkové plochy. Je rovněž možno natřít kousky kartonu, polyetylenu a pak je rozvěsit ke stropu.

Aplikace postřikem

Důkladně promíchejte 100 g přípravku AGITA 10[®] WG a 0,8 litry vlažné vody. Toto množství postačuje k ošetření budovy s podlahovou plochou 25 m² nebo odpovídající ploše stěn/stropu 40-50m², ošetřuje se jen asi 30% nebo 12-15 m². Postřikem se ošetřují plochy, kde se mouchy nejčastěji vyskytují.

Doporučení pro aplikaci:

- Do nádoby postřikovače, částečně naplněné vodou, se za stálého míchání vsype odvážené množství přípravku. Po doplnění vodou na stanovený objem a důkladném rozmíchání je možno AGITA 10[®] WG aplikovat. Znovu promíchejte pokud byla práce přerušena na víc jak 30 minut.
- Naředěnou suspenzi přípravku AGITA 10[®] WG použijte v den její přípravy, nejlépe ihned po její přípravě.
- Neaplikujte na špinavé nebo čerstvě nabílené zdi.
- AGITA 10[®] WG je možno aplikovat za přítomnosti zvířat, je však nutno se vyvarovat přímých zásahů zvířat.

Upozornění:

Přípravkem je zakázáno ošetřovat krmiva a zdroje pitné vody. Před postřikem odstraňte nezabalené nebo nezakryté potraviny z místnosti. Po aplikaci ve stájích je nutno umýt žlaby, napáječky a plochy určené k přípravě krmiva, pokud došlo k jejich kontaminaci. Přípravek je jedovatý pro včely.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci je nutno se vyvarovat požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo očí. Při aplikaci je nutno používat ochranný pracovní oděv Unita nebo Tonet - PE, ochranný obličejový štít ŠP15, nebo D-1 s čepcem + respirátor RU-20 s vložkovým filtrem A1, gumové rukavice a gumové boty, případně komerčně dostupné schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany. Při ředění postřiku se navíc používá zástěra z PVC nebo z pogumovaného textilu. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutno se důkladně omýt.

První pomoc:

Při požití

V případě náhodného požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení. Postiženého dopravte ihned k lékaři s informací, s jakým přípravkem pracoval. Zásadně platí zákaz podávání mléka, tuku a alkoholu !

Při zasažení oka

Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu patnácti minut a opět vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky

Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.

Při nadýchání

Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.

V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři !

Terapii případné otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, **tel: 224 91 92 93** .

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, dobře větraných skladech odděleně od krmiv a potravin při teplotách do +35 °C.

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdňné obaly se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně. Zbytky přípravku nesmí zasáhnout zdroje spodních vod ani recipienty povrchových vod.

Odpovědnost:

Uživatel plně odpovídá za škody, které byly zapříčiněny faktory, které výrobce nemůže ovlivnit. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo použitím přípravku.

Výrobce:

Novartis Animal Health Inc., Švýcarsko

Držitel registračního rozhodnutí:

Novartis s.r.o. Česká republika

číslo šarže: Uvedeno na obalu

Datum výroby: Uvedeno na obalu

® je ochranná známka firmy Novartis Animal Health Inc.